



RODERICK L. BREMBY, ລັດຖະມົນຕີ

K A N S A S

ກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ

KATHLEEN SEBELIUS, ຜັວງການລັດ

Q&A ກ່ຽວກັບບនູເໂຣຊີດສ

ບនູເໂຣຊີດສ ແມ່ນຫຍັງ?

ບនູເໂຣຊີດສ (Brucellosis) ແມ່ນພະຍາດຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກບັກເຕີຮູອງຊະນິດ ບຽຊ໌ (Brucella). ພະຍາດບັກເຕີຮູອງຊະນິດ ທີ່ມີຫຼັງຜົນສັນຫຼັງແຕກຕ່າງໆ ກັນ. ບັກເຕີຮູອງຊະນິດ ໄດ້ເກີດພະຍາດໃນແຕ່ລະປະເພດສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງແຕກຕ່າງໆ ກັນ. ບັກເຕີຮູອງຊະນິດ ສາຍພັນສາມາດຕິດເຊື້ອຢູ່ນຳແກະ, ແບ, ວົວຄວາຍ, ກວາງ, ກວາງ ອິລົດ, ໝູ, ໝາ ແລະ ບັນດາສັດ ອື່ນງໍ. ມະນຸດກາຍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອດ້ວຍການສໍາພັດກັບສັດຕ່າງໆ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມາຈາກສັດເກົ່ານັ້ນປິນເປົ້ອນເຊື້ອບັກເຕີ.

ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄືນ, ບនູເໂຣຊີດສ ສາມາດພາໃຫ້ເກີດອາການພະຍາດທີ່ມີຂັ້ນຕອນຄ້າຍຄືກັນກັບໄຂ້ຫວັດແລະລວມມີໄຂ້, ເຫຼືອອອກ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບຫຼັງແລະຮ່າງກາຍຊຸດໄຊມ. ການຕິດເຊື້ອຮູນແຮງຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງຫຼື ເຫຼືອຍໜຸ້ມຫົວໃຈທາງໃນອາດຈະເດີດຂຶ້ນສູງປະມານ 5 ເປົ້ນຂອງບັນດາກໍລະນີ. ບনູເໂຣຊີດສ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໝວດອາການພະຍາດທີ່ເປັນໃນໄລຍະຍາວຫຼືຊ້າເຮືອທີ່ມີອາການໄຂ້ກັບຄືນ, ປວດຄໍ່ແລະອ່ອນເພຍ.

ພົບພະຍາດບនູເໂຣຊີດສ ໃນຄືນຫຼືສັດປະຈຳບໍ່?

ບនູເໂຣຊີດສ ແມ່ນບໍ່ມີປະຈຳໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ 100 ຫາ 200 ກໍລະນີຕື່ປີ. ແຕ່ທາງກວ່າ ບনູເໂຣຊີດສ ສາມາດເກີດຂຶ້ນປະຈຳໃນບັນດາປະເທດທີ່ໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດຂອງສັດບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານການເກີດພະຍາດໃນສັດ. ບັນດາລາຍຊື່ຂອງອານາເຂດທີ່ມີພະຍາດ ບනູເໂຣຊີດສ ສູງ ແມ່ນ ອ່າງເມດີຕຽາເນຍ (ບອ່ກຕຸຍການ, ແອສປາຍ, ຜູ້ທາງພາກໃຕ້, ອິຕາລີ, ເງັກ, ຕັວກີ, ອາຟິກາກາ ເໜືອ), ທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ແລະເໜືອ, ເອີຣິບຕາເວັນອອກ, ອາຂີ, ອາຟິກາກາ, ເຂດຄາເລບງນ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ ຂີດສທ່ວນໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຂ້າ

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ທ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຂີວະພາບ

ອາຄານທ້ອງການຂອງລັດ ເຄີຣິຕິດສ, ຖະໜົນ1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໄທຣລະສັບ 785-296-8605 ແນັກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຄີຣິຕິດສ ສິນຂອງສາຫາວະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນັກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318

ເຊື້ອ ”ຂົດສປະຈຳ ພູ້ບ້ານ”, ຈາກບໍລິເວນເຫຼົ້ານີ້ທ້ອາດຈະເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມສົ່ງສະເພາະພະຍາດ ບនຸເຊົາໄວຂົດສ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ພະຍາດ ບនຸເຊົາໄວຂົດສ ຕິດຕໍ່ໄສຄົນ, ແລະຜູ້ທີ່ ເປົ້າທ່າທີ່ວ່າຈະກາຍເປັນຄົນຕິດເຊື້ອໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປຄົນເຮົາຕິດເຊື້ອໄດ້ສາມາກາ: ກິນຫຼື ດື່ມບາງຢ່າງທີ່ປິນເປົ້ອນດ້ວຍເຊື້ອບັກເຕັກ ທີ່ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດ ບនຸເຊົາໄວ ຂົດສ, ຫາຍໃຈເອົາບັກເຕັກ (ການຫາຍໃຈເຂົ້າ), ຫຼືເວລາທີ່ບັກເຕັກເຂົ້າຮ່າງກາຍໂດຍຜ່ານທາງຜົວໜັງທີ່ຖືກຕັດ ຫຼືຂຸດລອກ.

ວິທີທີ່ພົບເຫັນປົກກະຕິແມ່ນ ການຕິດເຊື້ອໂດຍຜ່ານທາງກິນຫຼືດື່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນິມ. ໃນເວລາທີ່ແກະ, ແບ່, ວົງຫຼືອຸດໄດ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວ, ນັ້ນມີມຂອງພວກມັນຈະປິນເປົ້ອນພະຍາດບັກເຕັກ. ຖ້າຫາກວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອ, ບັກເຕັກເຫຼົ້ານີ້ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄສ່ຄົນຜູ້ທີ່ດື່ມນີມຫຼືກິນ ຂົດສທີ່ເຮັດຈາກນິມທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດ.

ການຫາຍໃຈເຂົ້າເອົາບັກເຕັກ ບনຸເຊົາໄວຂົດສ ແມ່ນວິທີການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຮ້າຍແຮງສໍາລັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນໜັ້ງທີ່ວັງການນັ້ນ, ເຊັ່ນວ່າການເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງທິດລອງ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຊື້ອບຸກເຊື້ອພະຍາດ. ການຫາຍໃຈເຂົ້າເປັນປະຈຳແມ່ນເປັນຄວາມສໍາຄັນຕ່ັນຕາກໍລະມິລູກຈັງໃນໂຮງຂ້າສັດ.

ການປິນເປົ້ອນທີ່ເກີດຢູ່ປາດແຜຜົວໜ້າອາດຈະເປັນບັນຫາສໍາລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງຂ້າສັດ ຫຼືຫົ່ວໜັນ, ຜັກຫຼືສໍາລັບຄົນຈຳພວກບໍ່ກິນສັດ. ນາຍພານອາດຈະຕິດເຊື້ອຜ່ານບາດແຜ່ທາງຜົວໜັງຫຼືອຸບດຕີເຫດກິນບັກເຕັກເຫຼັງຈາກທີ່ທໍາຄວາມສະອາດກວາງ, ກວາງ ອີລົດ, ກວາງ ໃຫຍ່່ຊະນິດມີເຂົາແບນ ຫຼືໝູ່ປ່າທີ່ກິນຊາກສີບ

ບនຸເຊົາໄວຂົດສ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອຈາກຄົນໄປສູ່ຄົນໄດ້ບໍ່?

ແຜ່ເຊື້ອໂດຍຕິງຈາກຄົນໄປສູ່ຄົນຂອງ ບනຸເຊົາໄວຂົດສ ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໃຫ້ລູກໄດ້. ສິ່ງຜ່ານທາງເພດສາພັນແລະຜ່ານທາງການປູກຈຸລົງທີ່ປິນເປົ້ອນກໍ່ມີການລາຍງານວ່າສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້. ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຮັບເຊື້ອ ບනຸເຊົາໄວຂົດສ ຫາຍເພດສາພັນຫຼືທາງດ້ານການລັງລູກດ້ວຍນິມແມ່ ຄວາມສົ່ງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອອາດຈະຖືກກຳຈັດອອກພາຍໃນສາມນີ້.

ມີວິທີປັບປຸງກັນໃດແດ່ຈາກການຕິດເຊື້ອ?

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຂີວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຮັດຕິດສ, ຖະໜົນ1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໂທຣະສັບ 785-296-8605 ແນ້ກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຫດການສຸກສົນຂອງສາຫະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນ້ກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318

ມີ. ບໍ່ໄຫວ້ກິນນິມອັບປາສໂຕເຣຸ, ແຊີດສ, ຫຼືກະແລ້ມໃນເວລາເຕີນທາງ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແມ່ໄຈໃນຜະລິດຕະພັນປະຈຳວັນທີຂ້າເຊື້ອນັ້ນ. ຢ່າກິນມັນ. ນາຍພານແລະຄົນຕ້ອນຜູ້ສັດຕ້ອງໄສ່ຖິ່ມີຢ່າງໃນເວລາທີ່ຫົວຮ່າງກາຍສັດທີ່ຕາຍນັ້ນ. ບໍ່ມີວັກຊືນສໍາລັບຄົນ

ໝາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກວດພິບວ່າມີເຊື້ອ ບຽຊໂຣຊີດສ . ມັນສິ່ງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າຫຼືບໍ່?

ສາຍພັນຂອງເຊື້ອ ບຽຊໂຣຊີດສ ໃນປະຈຸບັນສາມາດຕິດໄສ່ໜ້າໄດ້. ສາຍພັນນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າການຕິດເຊື້ອຂອງໝາສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນຜົນຈາກການເຈັບປ່ວຍຂອງຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າສັດຕະວະແພດໄດ້ສໍາພັດກັບເລືອດຂອງສັດທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດກໍ່ແມ່ນມີຄວາມສິ່ງ. ເຈົ້າຂອງຂອງສັດລົງບໍ່ທີ່ວ່າເປັນຜູ້ສິ່ງໃນການຕິດເຊື້ອ. ເຊື້ອບັກເຕັມສາມາດຫາຍໄປຈາກສັດພາຍໃນສອງສາມວັນຈາກການບິນປົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການຕິດເຊື້ອຄົນໃໝ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ເປັນປະຈຳແລະຂອງເຫຼວຈາກວ່າງກາຍສັດບາງຂະນິດອາດຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ໃນນິ້ງອາຫິດ. ຄົນຜູ້ທີ່ມີລະບົບພູມຄຸມກັນອ່ອນແອ, ລວມທັງພວກເປັນມະເຮັງ, ເປັນເອດຫຼືຄົນທີ່ບຸກທ່າຍໄຂສັນຫຼັງຈະຕ້ອງບໍ່ຈັບໝາທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດບັກເຕັມບຽຊໂຣຊີດສ.

ການບໍ່ມະເຕີພະຍາດ ບຽຊໂຣຊີດສ ເຮັດແນວໄດ?

ບຽຊໂຣຊີດສ ບໍ່ມະເຕີໄດ້ໃນຫ້ອງວິໃຈໂດຍການຊອກຫາ ເຊື້ອ ບຽຊແຊນລາ (*Brucella*) ໃນຕົວຢ່າງຂອງເລືອດຫຼືມວນກະດູກ. ແລະການກວດເລືອດກໍ່ສາມາດຊອກຫາ ອັງຕີບໍ່ດີຂອງພະຍາດບັກເຕັມນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຖ້າຫາວ່າຈະວິທີການນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງເລືອດສອງຕົວຢ່າງ ເຊິ່ງສອງອາຫິດຫ່າງຈາກກັນ.

ມີການບໍ່ມີວິວສໍາລັບ ພະຍາດ ບຽຊໂຣຊີດສ ບໍ່?

ມີ, ແຕ່ວ່າການບໍ່ມີວິວອາດຈະຍາກສໍາລັບທ່ານໝໍທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງປະສິດທິພາບຂອງ ຢ່າຕ້ານເຊື້ອ. ມັນຂຶ້ນກັບເວລາຂອງການບໍ່ມີວິວແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ, ການຫາຍຈາກພະຍາດອາດຈະໃຊ້ເວລາສອງສາມອາຫິດ ເຖິງໝາຍເດືອນ. ອັດຕາການຕາຍແມ່ນຕໍ່ (2%), ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພາໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງເຫຼືອອຸ້ມ ຫົວໃຈ.

ຂ້ອຍແມ່ນສັດຕະວະແພດ, ແລະຫາກໍໄດ້ຮັບອຸປະດຕີເຫດຈາກການຫຼົງປັກຂ້ອຍເອງດ້ວຍເຂັ້ມສັກວັກຂົນຂອງສັດ (RB51 ຫຼື B19, ຫຼື REV1). ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດແນວໄດ?

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຂີວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຄີຣີດສ, ຖະໜົນ1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໂທຣະສັບ 785-296-8605 ແນັກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຄວານສຸກສິນຂອງສາຫາວະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນັກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318

ອັນນີ້ແມ່ນວັກຊືນທີ່ມີຂີວິດ, ແລະ B19 ແມ່ນຮູ້ກັນດີໃນນາມຂອງສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຕີເຮັດຈັກເລື່ອງວັກຊືນຕົວອື່ນບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ການແນະນຳນີ້ນຳກໍ່ເໝືອນກັນ. ທ່ານຈະຕ້ອງໄປພິບຜູ້ບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ. ຂຶ້ມູນພື້ນຖານຕົວຢ່າງຂອງເລືອດ ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ເພື່ອກວດສອບຫາ ອັງຕືືບໍດີ ແລະແນະນຳໃຫ້ທ່ານກິນຍາ ຕ້ານເຊື້ອ 3 ອາທິດ. ໃນເວລາສຸດທ້າຍທ່ານຈະຕ້ອງກວດເລືອດຄືນ ແລະຈະຕ້ອງເກັບຕົວຢ່າງເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ. (ຕົວຢ່າງ ສາມາດເກັບໃນອາທິດທີ 2) ເຮັດຄືກັນກັບຄຳແນະນຳໃນການໃຊ້ວັກຊືນ ແບບສະເປ (ພື້ນ) ໄສ່ຕາ (6 ອາທິດຂອງການ ບິນປົວກໍລະນີນີ້) ຫຼືພື້ນໃສ່ບາດແຜຜົວໜັງທີ່ເປົດ.

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຂີ່ວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຄຣຕິດສ, ຖະໜົນ 1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໂທລະສັບ 785-296-8605 ແນ້ກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຫດການສຸກເສີນຂອງສາຫາວະນະ:

ໂທໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນ້ກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318